

대장정결액(쿨프렙산) 복용 시 주의사항

대장내시경 검사의 정확도는 수검자의 대장 정결상태에 따라 크게 좌우됩니다.

I 음식관련 주의사항

검사 3일 전부터 ~ 2일 전까지

피할 음식

잡곡밥, 검은쌀, 콩나물밥, 현미밥, 깨죽, 녹두죽, 잣죽, 고추가루, 참기름, 들기름 등 ...



배추김치, 열무김치, 파김치, 얼갈이, 우거지, 콩나물, 고사리, 도라지, 미나리, 미역, 김, 설렁탕, 곰탕, 삼겹살, 고구마, 사과



씨 있는 과일 (수박, 참외, 딸기, 포도, 토마토, 키위, 메론 등), 고추씨, 옥수수, 견과류 (땅콩, 잣, 호두)



드릴 수 있는 음식

흰쌀밥, 흰죽만 가능



계란류, 두부류, 목, 생선류, 국물류, 빵종류, 음료류(탄산음료, 맑은 주스, 우유, 커피, 녹차 등), 감자, 바나나



검사 전 날

아침, 점심, 저녁 : 반찬 없이 흰쌀 죽
: 식사는 오후 6시 이전에 끝내시고 물은 충분히 드세요.



I 약제관련 주의사항


- ▶ 혈압약을 드시는 경우 : 오전 6시 소량의 물과 함께 복용하십시오.
- ▶ 항혈소판제와 항응고제 (아스피린: 아스트릭스, 플라빅스, 디스그렌, 프레탈정, 쿠마딘: 와파린 등)
→ 담당의와 상의 후 복용중지 여부를 결정하십시오.
→ 복용중지 가능 시 건강검진 일주일 전부터 복용을 중지해 주십시오.
- ▶ 검사 당일에는 혈당조절 약물이나 인슐린주사는 투여하지 마십시오.

쿨프렙산 조제 및 복용법

대장내시경 관련
문의전화

운영시간 : 월~금 7:30 ~17:30
Tel. 1588-7757

| 쿨프렙산 조제법 ▶ 1차와 2차 복용방법은 아래와 같이 동일합니다.



빈 통에 **A**제, **B**제
한 포씩 넣습니다.

찬물을 500mL
표시선까지 채워주세요.

뚜껑을 닫고 완전히
녹을 때까지 흔들어 주세요.

30분안에 500mL
모두 복용해 주세요.
(15분마다 250mL씩)

| 쿨프렙산 복용법

날 짜	시 간	복 용 법
검사 전날		저녁식사는 저녁 6시 이전까지 죽으로 드세요.
1	저녁 8시	쿨프렙산 500mL 1통을 드세요.
2	저녁 8시 30분	쿨프렙산 500mL 1통을 드세요.
3	저녁 9시	쿨프렙산 500mL 1통을 드세요.
4	저녁 9시 30분	물 500mL 에 가소콜 (가스제거제) 1포 를 넣어 잘 흔들어서 드세요.
검사 당일	아침	아침식사는 금식입니다.
		쿨프렙산 2차 복용은 아침 5시 부터 복용 시작합니다.
1	아침 5시	쿨프렙산 500mL 1통을 드세요.
2	아침 5시 30분	물 500mL 에 가소콜 (가스제거제) 1포 를 넣어 잘 흔들어서 드세요.

1차
복용

2차
복용